



**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA
w Poznaniu**

Oddział w Krotoszynie

tel./fax : (062) 725-42-36

ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 8, 63 - 700 Krotoszyn

OKR – 5122 – 32/03

Krotoszyn, 26.09.2003 r.

Komunikat Nr 29

Zwalczanie **rolnic w zbożach ozimych**

Na plantacjach zbóż ozimych obserwuje się liczne żerowanie gąsienic rolnic.

Rolnice żerują głównie nocą, stąd trudno zauważyć szkodnika w dzień. Najczęściej gąsienice uszkadzają części podziemne. Zabieg należy wykonać w czasie żerowania, stosując jeden z niżej zalecanych preparatów.

Preparat	Dawka na ha [kg/l]
Basudin 10 GR	40-60
Diazinon 10 GR	40-60

Granulaty stosować po zauważeniu uszkodzeń. Wyższe dawki zalecane są do zwalczania późniejszych stadiów larw.

Alfamor 050 SC	0,3
Alfazot 050 EC	0,3
Decis 2,5 EC	0,3
Decis Tab TB	12 tab.
Diazinon 250 EC	1,0
Karate 25 WG	0,25-0,3
Patriot 2,5 EC	0,3
Ripcord Nowy 050 EC	0,3
Ripcord Super 050 EC	0,3

Opryskiwanie wg sygnalizacji, gdy gąsienice znajdują się we wczesnych stadiach rozwojowych L₁ – L₂.



rolnice – gąsienice



rolnice - poczwarka

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety-instrukcji stosowania preparatu dołączonej do opakowania i ściśle przestrzegać jej zaleceń.

R.Kulka
Kierownik Oddziału